

PSZENICA OZIMA – Wpływ wieloletniego przedplonu zbożowego na plon pszenicy ozimej

(doświadczenie kontynuowane siódmym rokiem)

Strona lewa

Klasa gleby: II

Przedplon: pszenica ozima

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsiwne: N – 33 , P – 110, K – 165
– pogłówne: N – 170

Siew: 25.09.2007r.

Zaprawa: wg. hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowany odmianowo 150 – 229 kg/ha (500 szt./m², Turnia, Nutka – 450 szt./m²)

Odmiany:

- | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|
| 1. Legenda | 4. Ostka Strzelecka | 7. Obsiew (Batuta) |
| 2. Naridana | 5. Nateja | |
| 3. Zawisza | 6. Batuta | |

Zabiegi pielęgnacyjne:

| Data | Nawożenie azotowe w kg/ha | Zwalczanie chwastów | Zwalczanie chorób | Zwalczanie szkodników | Zapobieganie wyleganiu |
|-------------|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 06.09.2007. | 33 – Polifoska 6 | | | Karate Zeon 050 CS - 0,1l/ha | |
| 05.11.2007. | | Maczuga 75 WG - 25g/ha | | | |
| 11.03.2008 | 60 – Saletra amonowa | | | | |
| 14.04.2008 | | Atlantis 04 WG - 0,2kg/ha + Sekator 125 OD – 0,15l/ha + Actirob 842 EC – 1l/ha | | | |
| 06.05.2008 | 60 - Saletra amonowa | | | | Moddus 250 EC – 0,4l/ha |
| 07.05.2008 | | | Input 460 EC – 1l/ha | | |
| 29.05.2008 | | | Prosaro 250 EC – 1l/ha | | |
| 03.06.2008 | 50 – Saletra amonowa | | | | |
| 13.06.2008 | | | | Decis 2,5 EC – 0,25l/ha | |

Plony:

| Nr | Nazwa | Plon dt/ha (15%) |
|----|------------------|------------------|
| 1 | Legenda | 82,7 |
| 2 | Naridana | 84,7 |
| 3 | Zawisza | 81,8 |
| 4 | Ostka Strzelecka | 82,3 |
| 5 | Nateja | 78,6 |
| 6 | Batuta | 70,6 |
| | Ogółem | 80,1 |

