

PSZENŻYTO OZIME – kolekcja odmian**Strona lewa**

Klasa gleby: IV a

Przedplon: ziemniaki

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 18, P – 60, K – 90
– pogłównie: N – 152

Siew: 24.09.2007r.

Zaprawa: wg. hodowcy

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo 113 – 194 kg/ha (450 szt/m²)**Odmiany:**

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Aliko | 8. Grenado |
| 2. Borwo | 9. Madilo |
| 3. Pawo | 10. Moderato |
| 4. Pimej | 11. Hortenso |
| 5. Todan | 12. Gniewko |
| 6. Witon | |
| 7. Baltiko | |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu
06.09.2007	18 – Polifoska 6				
16.10.2007	32 – Saletra amonowa				
24.10.2007		Expert Met 56 WG - 0,35kg/ha		Alfazot 050 EC - 0,2l/ha	
11.03.2008	50 – Saletra amonowa				
28.04.2008			Capalo 337,5 SE – 2l/ha		
06.05.2008	50 – Saletra amonowa				Cerone 480 SL – 1l/ha
30.05.2008			Duet Ultra 497 SC – 0,6l/ha		
04.06.2008	20 – Saletra amonowa				

PSZENŻYTO OZIME - charakterystyka odmian wg „Listy Opisowej Odmian 2007 COBORU”

Lp.	Odmiana	Plon lata 2004 - 2006 % wzorca		Mrozoodpor- ność	Wyleganie	Wysokość cm	Dojrzalność woskowa dni od 1.01	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Masa 1000 ziaren g	Gęstość w stanie zsypanym	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunana
		a ₁	a ₂										
	Wzorzec dt/ha,	78,0	90,6	skala 9 ⁰									
1	Aliko	102	102	5,5	6,4	129	197	5	45,1	6	5	5	7,5
2	Borwo *												
3	Pawo LZO	104	102	6	6,3	121	197	5	43,9	9	5	5	7,8
4	Pigmej *												
5	Todan LZO	101	101	5	6,6	123	197	4	48,1	5	4	5	8,0
6	Witon LZO	102	102	5,5	7,8	116	196	5	38,9	5	4	6	6,3
7	Baltiko	103 ^{4,5}	104 ^{4,5}	4	7,9	99	196	5	42,7	6	5	5	6,6
8	Grenado	105 ^{5,6}	102 ^{5,6}	6	7,3	97	198	5	38,0	5	5	2	8,5
9	Madilo*												
10	Moderato LZO	102	103	5	5,7	127	197	5	40,3	6	5	5	8,6
11	Hortenso	103 ^{4,6}	103 ⁶	5,5	6,7	130	197	5	45,4	4	7	5	7,5
12	Gniewko	101	98	4	8,2	102	198	5	43,2	5	4	6	8,5

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

LZO – Lista Zalecanych Odmian

* - odmiany nie znajdują się na liście opisowej odmian 2007 (brak danych)

^{4,5} – średnia plonu z roku 2004 i 2005

^{5,6} – średnia plonu z roku 2005 i 2006

⁶ – plon z roku 2006

Wzorzec: 2006, 2005 - Kazo, Woltario, Sorento, Moderato; 2004 – Lamberto, Kazo, Woltario, Sorento

Plony:

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Borwo	69,1
2	Pawo	66,1
3	Pigmej	67,3
4	Todan	58,8
5	Witon	78,7
6	Baltiko	75,7
7	Grenado	99,7
8	Madilo	97,6
9	Moderato	72,1
	Ogółem	76,1

Odmiany: Aliko, Hortenso i Gniewko - poletka zniszczone przez ptaki

