

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: IVa

Przedplon: żyto, pszenżyto ozime

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 94, P – 70 K – 100
– pogłównie: N – 32

Rozstawa: 67,5 x 25 cm

Sadzenie: 25.04.2008r

Odmiany:

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| 1. Cyprian | 4. Jelly | 7. Inwestor |
| 2. Cekin | 5. Bartek | 8. Pokusa |
| 3. Zeus | 6. Rumpel | |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
24.04.2008	46 –Mocznik + 48 - Salmag			
06.05.2008		Sencor 70 WG – 0,4 – 0,5kg/ha		
15.05.2008	32 – Saletra amonowa			
18.06.2008			Tatoo C 750 SC – 2l/ha	
17.07.2008			Pyton 60 WG – 1,2l/ha	Decis 2,5 EC – 0,3l/ha

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2007”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulinarny **	Smak w skali 9 ^o ***	Odpor. na zarzę liści w skali 9 ^o	
1.	Cyprian	N [*]	wczesna	jadalny	2007	110 ^{5,6}	110 ^{5,6}	12,9	jas.żółta	B	7	5
2.	Cekin	N	śr. wczesna	jadalny	2004	117 ⁶	120 ⁶	13,9	jas.żółta	BC-C	7	4
Wzorzec 2004-06					435 dt/ha	390 dt/ha						
3.	Zeus	N	śr. późna	jadalny	2000	107 ^{4,6}	101 ^{4,6}	15,0	żółta	BC	6,5	6
4.	Jelly	N	śr. późna	jadalny	2005				żółta	B	7,5	5
Wzorzec 2004-06					432 dt/ha	394 dt/ha						
5.	Bartek	N	śr. wczesna	jadalny	2003	120 ^{4,6}	121 ^{4,6}	14,6	jas.żółta	B	7	5
Wzorzec 2004-06					432 dt/ha							
6.	Rumpel	N	śr. wczesna	skrobiowy	2000	99 ^{4,6}		18,0	biała			5
7.	Inwestor	N	późna	skrobiowy	2005	94 ^{4,6}	112 ^{4,6}	19,2 ^{4,6}	kremow	C	6,5	7
Wzorzec 2004-06					435 dt/ha		17,2					
8.	Pokusa	N	późna	skrobiowy	2006	108 ^{4,6}		17,2 ^{4,6}	jas.żółta	BC	7	4

N */ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (AB - zwięzły, sałatkowy; B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty; C - mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą

Oznaczenia małymi cyframi w indeksie górnym oznaczają lata badań np. 110^{5,6} oznacza średni plon 110 % wzorca dla odmiany badanej w roku 2005 i 2006.

Plony :

Odmiana	Plon (dt/ha)	Odmiana	Plon (dt/ha)
Milek – b.w	324	Bartek – śr.w	375
Molli – b.w	258	Elanda – śr.w	317
Cyprian – w	385	Tajfun – śr.w	362
Augusta – w	324	Rumpel – śr.w/skr.	312
Oman – w	332	Pirol – śr.w	325
Owacja - w	343	Zeus – śr.p	309
Karlana -w	305	Jelly – śr.p	295
Cekin – śr.w	421	Inwestor – p/skr.	289
Benek – śr.w	320	Pokusa – p/skr.	318

b.w – odmiana bardzo wczesna;

w – odmiana wczesna;

śr.w – odmiana średnio wczesna;

śr.p – odmiana średnio późna;

p – odmiana późna;