

**ŁUBIN ŻÓŁTY I WĄSKOLISTNY – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa, IIIb

Przedplon: kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N - 0 , P – 45 , K – 70

Siew: 07.04.2008r.

Nasiona zaprawiano zaprawą Vitavax 200 FS - 350 ml/100kg nasion (Mister, Sonet - zaprawa Sarfun 450 FS - 250 ml/100kg nasion)

Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo: 150 – 200 kg/ha

**Odmiany:** kolejność od kamienia:

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mister – łubin żółty      | 6. Zeus - łubin wąskolistny   |
| 2. Sonet – łubin wąskolistny | 7. Graf - łubin wąskolistny   |
| 3. Lord - łubin żółty        | 8. Boruta - łubin wąskolistny |
| 4. Parys - łubin żółty       | 9. Bojar - łubin wąskolistny  |
| 5. Kalif - łubin wąskolistny |                               |

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
09.04.2008	Afalon dyspersyjny 450 SC – 1,3l/ha		
18.06.2008		Sarfun 500 SC.– 0,7l/ha	

**ŁUBIN ŻÓŁTY – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2007”**

Odmiana	Rok rejestr.	Plon nasion (% wzorca)	Długość okresu wegetacji (dni)	Wysokość roślin (cm)	Masa 1000 nasion (g)	Zawartość białka ogólnego w nasionach (%)	Wyleganie w skali 9° *
Wzorzec 2004-06		<b>21,0 dt/ha</b>					
<b>Mister</b>	2003	104	111	73	136	43,7	8,6
<b>Lord</b>	2006	99	112	73	126	44,2	8,2
<b>Parys</b>	1988	91	119	85	134	43,5	7,1

\*/ – wyleganie przed zbiorem ( 9 ° oznacza brak wylegania )

**ŁUBIN WĄSKOLISTNY – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2007”**

Odmiana	Rok rejestr.	Plon nasion (% wzorca)	Długość okresu wegetacji (dni)	Wysokość roślin (cm)	Masa 1000 nasion (g)	Zawartość białka ogólnego w nasionach (%)	Wyleganie w skali 9°
Wzorzec 2004-06		<b>32,4 dt/ha</b>					
Sonet S*	1999	99	104	64	155	31,3	8,7
Kalif	2006	108	112	72	143	31,2	6,2
Zeus	2002	104	109	78	136	32,8	8,2
Graf	2004	102	111	73	128	33,2	8,1
Boruta S	2002	99	111	74	144	34,3	8,4
Wzorzec 2004-06		<b>30,7 dt/ha</b>					
Bojar	2007	105	107	60	151	30,3	7,8

\* / – odmiana samokończąca – ma zredukowaną liczbę rozgałęzień, jest słabiej ulistniona oraz równomiernie dojrzewa  
( zwiększona ilość wysiewu – 100-130 roślin/m<sup>2</sup> )

**Plony:**

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Mister ł.ż.	21,3
2	Lord ł.ż.	23,0
3	Parys ł.ż.	22,6
4	Sonet ł.w.	18,0
5	Kalif ł.w.	27,6
6	Zeus ł.w.	23,6
7	Graf ł.w.	25,5
8	Boruta ł.w.	23,4
9	Bojar ł.w.	20,9

ł.ż – łubin żółty

ł.w. – łubin wąskolistny