

PSZENICA JARA – kolekcja odmian**Strona prawa**

Klasa gleby: II

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 50, P – 52, K – 95
– pogłównie: N – 70

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 03.04.2009r.

Ilość wysiewu: 180 – 290 kg/ha (500 szt./m²)**Odmiany:** licząc od strony kamienia

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Tybalt | 8. Koksa |
| 2. Ethos | 9. Cytra |
| 3. Raweta | 10. Waluta |
| 4. Trappe | 11. Katoda |
| 5. Griwa | 12. Bombona |
| 6. Zadra | 13. Parabola |
| 7. Nawra | 14. Łagwa |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
03.04.2009	50 - Salmag					
14.05.2009		Lintur 70 WG – 120g/ha + Chwastox Extra 300 SL – 1l/ha				
21.05.2009	50 – Saletra amonowa					
26.05.2009			Tilt Plus 400 EC – 1l/ha			Ekolist Standard – 4l/ha
04.06.2009					Cerone 480 SL – 0,75 l/ha	
25.06.2009	20 – Saletra amonowa					

PSZENICA JARA – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2008”

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2005-2007		Wyleganie, skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Reakcja na Al+++ skala 9 ⁰	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Brunatna plamistość liści	Choroby podstawy źdźbła	Septorioza liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów
		a ₁	a ₂										
Wzorzec, dt z ha		58,1	66,8										
elitarna (grupa E)													
1.	Bombona ¹ LZO	100	99	7,8	95	5	8,0	7,7	7,5	8,3	7,2	7,8	8,1
jakościowa (grupa A)													
2.	Griwa ¹ LZO	98	100	7,3	93	4	8,2	6,6	7,1	7,9	6,6	7,4	7,6
3.	Hewilla ¹ LZO	100	102	7,1	97	5	7,6	7,0	7,6	8,1	6,6	7,5	8,0
4.	Katoda ¹	104 ^{6,7}	101 ^{6,7}	7,6	95	4	8,3	8,2	8,0	7,8	7,0	7,3	7,3
5.	Koksa ¹	95	93	7,8	95	5	8,2	7,9	7,8	8,3	7,1	7,8	8,1
6.	Monsun LZO	101	102	7,6	85	5	7,2	7,5	7,7	8,0	7,2	7,6	7,9
7.	Nawra ¹ LZO	97	98	7,3	82	6	7,9	7,7	7,5	7,7	6,5	7,4	7,9
8.	Parabola ¹ LZO	102	101	7,5	91	5	7,9	7,5	7,7	8,0	7,0	7,5	7,8
9.	Raweta ¹	98	97	7,8	92	5	7,7	7,7	7,8	8,3	7,0	7,9	8,4
10.	Tybalt ^{o/1} LZO	106	104	7,5	82	5	8,5	8,3	7,8	8,3	7,2	7,6	8,1
11.	Waluta ¹	102	102	6,9	97	4	7,6	8,2	7,8	7,9	7,1	7,6	7,8
chlebowa (grupa B)													
12.	Cytra ¹	97	97	8,0	85	5	8,0	8,1	7,9	8,2	7,6	7,6	7,8
13.	Trappe	105	104	7,8	86	4	7,8	8,0	7,1	8,0	6,6	7,4	7,8
14.	Zadra ^{1 o/}	101	100	7,5	92	5	7,3	7,8	8,0	8,2	7,0	7,9	8,3

Wzorzec: 2007 - Nawra, Tybalt, Hewilla, Parabola; 2006 – Nawra, Tybalt, Hewilla; 2005 – Jasna, Nawra, Koksa, Tybalt^{o/} – ostka;

LZO – Lista Zalecanych Odmian

¹ - odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy

^{o/} – ostka;

^{6,7} – średnia plonu z roku 2006 i 2007

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)

Plony:

Nr	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Tybalt	53,2
2	Ethos	54,2
3	Raweta	47,3
4	Trappe	56,6
5	Griwa	53,7
6	Zadra	57,6
7	Nawra	55,6

8	Koksa	55,2
9	Cytra	51,4
10	Waluta	57,8
11	Katoda	62,4
12	Bombona	58,8
13	Parabola	60,0
14	Łagwa	63,9
	Średnia	56,3