

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: IVa

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 90, P – 58 K – 22
– pogłówne: N – 32

Rozstawa: 67,5 x 25 cm

Sadzenie: 20 - 24.04.2009r

Odmiany:

1. Milek	7. Adam	13. Gala
2. Aruba	8. Owacja	14. Lambada
3. Bartek	9. Ametyst	15. Vienna
4. Medea	10. Tajfun	16. Bellarosa
5. Cyprian	11. Promyk	17. Jelly
6. Cekin	12. Rumpel	

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
20.04.2009	45 –Mocznik 45 - Salmag			
13.05.2009	32 - Saletra amonowa			

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2008

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulina -rny **	Smak w skali 9° ***	Odpor. na zarzę liści w skali 9°
1.	Milek	N	b. wczesna	2006	111 ^{5,7}	96 ^{5,7}	13,7	jas.żółt	BC	6,5	2
2.	Aruba	N	wczesna	2007	107 ^{5,6}	105 ^{5,6}	14,5	kremow	B	6,5	4
Wzorzec 2005-07					422 dt/ha	387 dt/ha					
3.	Bartek	N	śr. wczesn	2003	129	131	14,5	jas.żółt	B	7	5
4.	Medea	N	poźna	2005	80 ⁶	77 ⁶	11,2	jas.żółt	B	7	6,5
5.	Cyprian	N	wczesna	2007	110 ^{5,6}	110 ^{5,6}	12,9	jas.żółta	B	7	5
6.	Cekin	N	śr. wczesn	2004	117 ^{6,7}	120 ^{6,7}	14,7	jas.żółt	BC-C	7	4
7.	Adam	N	śr. wczesn	2005	94 ^{6,7}	121 ^{6,7}	17,7 ^{6,7}	biała	C	6	3
Wzorzec 2005-07					376 dt/ha	354 dt/ha					
8.	Owacja	N	wczesna	2006	110	109	13,4	jas.żółt	B-BC	7	4
9.	Ametyst ¹⁾	N	śr. wczesn	2009				kremow	C	6,2	6
Wzorzec 2005-07					422 dt/ha	387 dt/ha					
10.	Tajfun	N	śr.wczesna	2004	118	122	15,9	żółta	B-BC	7	5
11.	Promyk	N	śr.wczesna	2008	113 ^{6,7}	108 ^{6,7}	13,4	żółta	B-BC	7	3
Wzorzec 2005-07					422 dt/ha						
12.	Rumpel	N	śr.wczesna	2000	98		17,6	biała			5
13.	Gala ²⁾	N	wczesna					żółta	B		
14.	Lambada ³⁾	N	śr.wczesna					żółta	B		
15.	Vienna ⁴⁾	N	wczesna					jas.żółt			
16.	Bellarosa	N	wczesna	2006	108 ⁵	109 ⁵	12,4	żółta	B	7	2

17.	Jelly	N	śr.późna	jadalny	2005	113 ⁷	117 ⁷	14,5	żółta	B	7,5	5
-----	-------	---	----------	---------	------	------------------	------------------	------	-------	---	-----	---

N*/ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty; C - mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą

Oznaczenia małymi cyframi w indeksie górnym oznaczają lata badań np. 117^{6,7} oznacza średni plon 117 % wzorca dla odmiany badanej w roku 2006 i 2007.

1) **Ametyst** – odmiana średnio wczesna, jadalna, bulwy o kremowym miąższu. Daje wysokie plony bulw. Odmiana mątwikoodporna. Jest smaczną odmianą. Wykształca bulwy okrągłoowalne.

2) **Gala** – odmiana wczesna, jadalna. Wydajność – bardzo wysoka. Dobry smak. Bulwy tej odmiany są okrągłoowalne do owalnych. Miąższ koloru żółtego. Odmiana mątwikoodporna. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wirusa Y i liściozwoju.

3) **Lambada** – odmiana średnio wczesna, jadalna w typie B. Wydajność duża. Dobry smak. Bulwy tej odmiany są owalne do podłużnie owalnych. Wyróżnia się bardzo dużą odpornością na wirusa Y i liściozwoju. Odmiana mątwikoodporna.

4) **Vienna** – odmiana wczesna, jadalna. Ma dobry smak i jest zwięzła podczas gotowania. Bulwy podłużnie owalne. Kolor miąższu jasnożółty. Odmiana mątwikoodporna. Wysoka odporność na parcha, czarną nóżkę i rizoktoniozę

