

BURAKI CUKROWE - ocena odporności wybranych odmian na choroby grzybowe

Strona lewa

Klasa gleby: II, III a

Przedplon: zboża ozime

Jesienią zastosowano obornik w dawce 32 t/ha

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 80, P – 100, K – 150;

– pogłównie: N – 40

Siew: 01.04.2009r. w ilości 1,2 j.s. na 1 ha

Rozstawa rzędów: 45x18 cm

Odmiany: kolejność od kamienia

1. Sanetta

3. Sporta

5. Picasso

2. Silvetta

4. Monza

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie szkodników	Zwalczanie chorób	Stosowanie biostymulatora
01.04.2009	80 – Salmag B				
02.04.2009		Pyramin 65 WG – 2,5kg/ha			
17.04.2009		Betanal Elite 274 EC – 0,9l/ha + Tornado 700 SC – 1,5l/ha			
05.05.2009		Betanal Elite 274 EC – 1l/ha + Tornado 700 SC – 1,5l/ha			
11.05.2009	12,5 – Salettra am. 27,5 - Salmag B				
21.05.2009		Betanal Elite 274 EC – 1l/ha + Tornado 700 SC – 1,5l/ha			
30.06.2009				Duett Ultra 497 SC – 0,7 l/ha	
20.08.2009				Horizon 250 EW – 0,8l/ha	
03.09.2009				Duett Ultra 497 SC – 0,7 l/ha	