

PSZENICA OZIMA – Figura – porównanie działania herbicydów**Strona lewa**

Klasa gleby: IIIb

Przedplon: łubin

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsiewne: N – 0, P – 38, K – 66
– pogłównne: N – 170

Siew: 26.09.2008r.

Zaprawa: □rytan Universal 094 FS – 400 ml z dodatkiem 200 ml wody/100kg ziarna.

Ilość wysiewu: 259 kg/ha

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu
27.03.2009	60 – Saletra amonowa			
30.04.2009	60 – Saletra amonowa			
05.05.2009		Input 460 EC – 0,75 l/ha		
18.05.2009				Cerone 480 SL – 0,75 l/ha
08.06.2009	50 – Saletra amonowa			
10.06.2009		Fandango 200 EC – 1l/ha		Decis 2,5 EC – 0,25 l/ha

Stosowane herbicydy:

Lp.	Nazwa herbicydu	Dawka na ha	Data zabiegu
1.	Lintur 70 WG	180g/ha	09.04.2009
	Axial 100 EC + Adigor 440 EC	0,45l/ha + 1,35l/ha	17.04.2009
2.	Huzar 05 WG + Esteron 564 EC	200g/ha + 0,5l/ha	08.04.2009
3.	Alister Grande 190 OD	1l/ha	12.10.2008
4.	Legato 500 SC	0,3l/ha	31.10.2008