

BURAKI CUKROWE - Picasso. Goldena

Strona prawa

Klasa gleby: IIIa, IIIb

Przedplon: kukurydza

Jesienią zastosowano obornik w dawce 32 t/ha

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 82,5, P – 52, K – 138,5
– pogłównie: N – 40

Siew: 08.04.2010r. w ilości 1,2 j.s. na 1 ha

Rozstawa rzędów: 45x18 cm

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie szkodników	Zwalczanie chorób	Stosowanie biostymulatora
07.04.2010	82,5 - Salmag				
09.04.2010		Pyramin 65 WG – 2,5 kg/ha + Metafol 700 SC – 1 l/ha			
26.04.2010		Metafol 700 SC- 1,5l/ha			
04.05.2010		Betanal Elite 274 EC 1l/ha + Safari 50 WG - 30g/ha			
10.05.2010		Betanal Elite 274 EC 1l/ha + Safari 50 WG - 30g/ha (poierzchnia 0,42 ha)			
16.06.2010		Leopard 05 EC – 1 l/ha			Basfoliar 36 Extra – 5 l/ha
11.08.2010				Duett Ultra – 497 SC – 0,6 l/ha	

