

PSZENŻYTO JARE – kolekcja odmian**Strona lewa**

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięte: N – 50, P – 50, K – 40
– pogłównie: N -

Zaprawa: wg. hodowcy

Siew: 12.04.2010 r.

Ilość wysiewu zróżnicowana odmianowo: 220-235 kg/ha (500 szt/m²)**Odmiany:** kolejność od kamienia

1. Nagano
2. Milewo
3. Milkaro

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników
12.04.2010	50 - Salmag				
12.05.2010		Sekator 125 OD – 0,15 l/ha			
21.05.2010			Sarfun Pro 187,5 S.C. – 2l/ha		
26.05.2010	50 – Saletra amonowa				

PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2009”

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2005-2007		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Dojrzałość wosk. dni od 1.01.	MTZ g	Reakcja na Al+++	Gęstość w stanie zsypanym	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunatna	Septorioza liści
		a ₁	a ₂										
Wzorzec dt z ha		54,8	64,2										
1.	Nagano	104	105	7,3	94	205	40,6	5	6	5	6	7,5	7,0
2.	Milewo	107	105	7,2	103	204	39,5	5	5	5	5	8,0	7,7
3.	Milkaro	105	103	6,1	104	204	40,5	5	5	5	5	8,0	7,9

Wzorzec:2008 - Dublet, Milkaro, Nagano; 2007 – Dublet, Migo, Milkaro, Wanad; 2006 – Dublet, Kargo, Matejko, Mieszko, Migo,

a₁ – przeciętny poziom agrotechniki, a₂ – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem, preparaty wieloskładnikowe dolistne)**Plony:**

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Nagano	59,1
2	Milewo	57,0
3	Milkaro	57,7
	Średnia	57,9

