

PSZENŻYTO JARE – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwne: N – 50 , P – 36 , K – 80
– pogłównie: N - 50

Zaprawa: wg. hodowcy

Siew: 04.04.2011

Obsada: 500 szt/m²**Odmiany:** licząc od strony kamienia:

- | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Andrus [233] ¹ | 3. Milkaro [232] | 5. Nagano [236] |
| 2. Milewo [176] | 4. Dublet [219] | |

¹W nawiasach ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
28.10.2010	Orka przedzimowa
28.03.2011	Agregat uprawowy
01.04.2011	Agregat uprawowy (przed siewem)

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników
25.10.2010	14 – (N) fosforan amonu 36 – (P) fosforan amonu 80 – (K) sól potasowa				
31.03.2011	50 – (N) Salmag				
09.05.2011		Lintur 70 WG – 150 g/ha			
24.05.2011	50 – (N) saletra amonowa				
26.05.2011			Amistar 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha		

PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2010”

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2007-2009		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Dojrzałość wosk. dni od 1.01.	MTZ g	Reakcja na Al+++	Gęstość w stanie zsymp.	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunatna	Septorioza liści
		a ₁	a ₂										
Wzorzec dt z ha		56,3	65,8										
1.	Andrus	102	100	6,2	104	207	43,4	5	5	5	3	8,1	7,5
2.	Milewo	104	104	7,1	103	205	40	5	5	5	5	8	7,3
3.	Milkaro	102	100	5,9	105	206	41,5	5	5	5	5	7,9	6,6

4.	Dublet	104	101	6,5	99	207	41,5	4	7	5	5	7,9	7,1
5.	Nagano	102	101	7,3	95	206	41,2	5	6	5	6	7,5	6,7

Pszenżyto Jare – kolekcja odmian

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (15%)
1	Andrus	57,2
2	Milewo	62,7
3	Milkaro	60,0
4	Dublet	56,2
5	Nagano	63,8
	Średnia	60,0

