

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IVa

Przedplon: pszenżyto ozime

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 90 P – 5 , K – 97
– pogłównie: N – 35

Rozstawa: 67,5 x 25 cm

Sadzenie: 26.04.2011

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
21.09.2010	Orka przedzimowa
26.04.2011	Agregat uprawowy
25.05.2011	Obredlanie

Odmiany:

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. Cyprian | 5. Jutrzenka | 9. Michalina |
| 2. Owacja | 6. Gustaw | 10. Stasia |
| 3. Ametyst | 7. Irys | 11. Finezja |
| 4. Bursztyn | 8. Aruba | 12. Tetyda |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
26.04.2011	45 – (N) Mocznik 45 – (N) Salmag			
10.05.2011		Sencor 70 WG – 0,5 kg/ha		
25.05.2011	35 – (N) Saletra amonowa			
05.07.2011			Infito 687,5 SC – 1,4 l/ha	

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2010”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogóln. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulina -rny **	Smak w skali 9° ***	Odpor. na zarazę liści w skali 9°	
Wzorzec 2006-09					423 dt/ha	404 dt/ha						
1.	Cyprian	N	wczesna	jadalny	2007	120 ^{6,8,9}	118 ^{6,8,9}	13,2	jas.żółta	B	7	5
2.	Owacja	N	wczesna	jadalny	2006	108	107	13,5	jas.żółt	B-BC	7	4
3.	Irys		b.wczesna	jadalny	1975				biała	B	7	3
Wzorzec 2006-09					430 dt/ha	403 dt/ha						
4.	Ametyst	N	śr. Wczesna	jadalny	2009	145 ^{7,8}	144 ^{7,8}	13,6	kremow	BC	6	6
5.	Bursztyn	N	śr.wczesna	jadalny	2010	109 ^{8,9}	110 ^{8,9}	15,7	biała	B-BC	6,3	5
6.	Jutrzenka	N	śr. Wczesna	jadalny	2009	115 ^{7,8}	122 ^{7,8}	13,5	jas.żółt	BC	7	2
Wzorzec 2006-09					483 dt/ha	472 dt/ha						

7.	Gustaw	N	śr.późna	jadalny	2010	100 ^{8,9}	103 ^{8,9}	15,8	kremow	BC	6,2	5
Wzorzec 2006-09						423 dt/ha	404 dt/ha					
8.	Aruba	N	Wczesna	jadalny	2007	109 ⁶	106 ⁶	14,0	kremow	B	6,5	4
9.	Michalina	N	Wczesna	jadalny	2010	98 ^{8,9}	98 ^{8,9}	11,4	jas.żółt	B	6,7	3
Wzorzec 2006-09						430 dt/ha	403 dt/ha					
10.	Finezja	N	śr. Wczesna	jadalny	2007	123 ^{6,9}	126 ^{6,9}	14,9	jas.żółt	BC	6,5	4,5
11.	Tetyda	N	śr. wczesna	jadalny	2008	135 ^{6,7}	133 ^{6,7}	11,8	jas.żółt	BC-C	7,5	5
12.	Stasia	N	śr. Wczesna	jadalny	2010	125 ^{8,9}	128 ^{8,9}	14,0	żółta	B	6,7	4

N */ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą

Oznaczenia małymi cyframi w indeksie górnym oznaczają lata badań np. 135^{6,7} oznacza średni plon 135 % wzorca dla odmiany badanej w roku 2006 i 2007.

