

**PSZENŻYTO JARE – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: II

Przedplon: trawy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięte: N – 60 , P – 40 , K – 90  
– pogłównie: N - 50

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 02.04.2012

Ilość wysiewu zróżnicowana odmianowo: 226-282 kg/ha (500 szt/m<sup>2</sup>)**Odmiany:** kolejność od drogi

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Nagano [276] <sup>1</sup> | 4. Milkaro [243] |
| 2. Dublet [226]              | 5. Milewo [270]  |
| 3. Andrus [282]              |                  |

<sup>1</sup> – w nawiasach podano ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
26.10.2011	Orka przedzimowa
02.04.2012	Agregat uprawowy

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
15.03.2012	60 – (N) saletra amonowa					
02.05.2012		Sekator 125 OD – 0,15 l/ha				
15.05.2012	50 – (N) saletra amonowa					
28.05.2012			Soligor 420 EC – 0,8 l/ha			Plonvit Opty – 3 kg/ha
12.06.2012					Pirimor 500 WG – 0,25 kg/ha	

**PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2011”**

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2008-2010		Wyleganie skala 9 <sup>0</sup>	Wyso-kość roślin cm	Dojrza-łość wosk. dni od 1.01.	MTZ g	Reakcja na Al+++	Gęstość w stanie zsy-p.	Porasta-nie w kłosach	Zawa-rtość białka	Rdza brunatna	Septo-riozia liści
		A <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>										
<b>Wzorzec dt z ha</b>		<b>57,7</b>	<b>65,3</b>										
1.	Andrus	99	98	6,2	109	208	41,7	5	4	5	3	8,2	7,4
2.	Milewo	98	101	6,8	108	206	37,9	5	5	5	5	8,0	6,9
3.	Milkaro	100	99	6,0	109	206	40,4	5	5	5	5	8,1	6,5
4.	Dublet	103	101	6,3	104	208	39,7	4	7	5	5	7,9	7,2
5.	Nagano	99	98	7,1	99	207	39,1	5	6	5	6	7,7	7,0

**Plony:**

<b>Nr</b>	<b>Nazwa odmiany</b>	<b>Plon dt/ha (15%)</b>
1	Nagano	61,09
2	Dublet	60,74
3	Milewo	60,58
4	Milkaro	51,89
5	Andrus	51,23
	<b>Średnia</b>	<b>57,1</b>