

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: IV a

Przedplon: rośliny strączkowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 90, P – 53, K – 125
– pogłównie: N – 30

Rozstawa: 67,5 x 25 cm

Sadzenie: 27-30.04.2012

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
25.10.2011	Orka przedzimowa
02.04.2012	Agregat uprawowy
20.04.2012	Agregat uprawowy
27.04.2012	Agregat uprawowy
21.05.2012	Obredlanie

Odmiany: kolejność od drogi

1. Aruba	9. Bursztyn	17. Wega
2. Michalina	10. Gustaw	18. Ballerina
3. Gwiazda	11. Bellarosa	19. Folva
4. Stasia	12. Vlneta	20. Hanna
5. Tetyda	13. Ewelina	21. Senna
6. Irys	14. Jelly	22. V 100
7. Irga	15. Molli	
8. Ametyst	16. Gala	

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
27.04.2012	45 – (N) Mocznik 45 – (N) Salmag			
08.05.2012		Sencor 70 WG – 0,6 kg/ha		
21.05.2012	30 – (N) Saletra amonowa			
05.07.2012			Infinito 687,5 – 1,4 l/ha	

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2011”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulina -rny **	Smak w skali 9° ***	Odpor. na zarzę liści w skali 9°	
Wzorzec 2007-10					460 dt/ha	439 dt/ha						
1.	Aruba	N	wczesna	jadalny	2007	93 ¹⁰	93 ¹⁰	15,1	kremow	B	6,5	4
2.	Michalina	N	wczesna	jadalny	2010	101 ⁸⁻¹⁰	102 ⁸⁻¹⁰	11,8	jas.żółt	B	6,5	3
3.	Gwiazda	N	wczesna	jadalny	2011	103 ⁹⁻¹⁰	103 ⁹⁻¹⁰	11,8	jas.żółt	B	7	3
Wzorzec 2007-10					454 dt/ha	430 dt/ha						
4.	Tetyda	N	śr. wczesna	jadalny	2008	132 ⁷	124 ⁷	11,8	jas.żółt	BC-C	7,5	5
5.	Stasia	N	śr. wczesna	jadalny	2010	113 ⁸⁻¹⁰	114 ⁸⁻¹⁰	12,8	żółta	B	6,5	4
6.	Irys		b.wczesna	jadalny	1975				biała	B	7	3
7.	Irga	N	śr. wczesna	jadalny	1987				kremow	B	6,5	2
8.	Ametyst	N	śr. wczesna	jadalny	2009	137 ^{7,8,10}	131 ^{7,8,10}	13,6	kremow	BC	6	6
9.	Bursztyn	N	śr. wczesna	jadalny	2010	98 ^{8,9}	98 ^{8,9}	14,1	biała	B-BC	6,3	5
Wzorzec 2007-10					509 dt/ha	480 dt/ha						
10.	Gustaw	N	śr.późna	jadalny	2010	95 ^{8,9}	97 ^{8,9}	13,4	kremow	BC	6	5
Wzorzec 2007-10					460 dt/ha	439 dt/ha						
11.	Bellarosa	N	wczesna	jadalny	2006	104 ⁸⁻¹⁰	107 ⁸⁻¹⁰	12,4	żółta	B	7	2
12.	Vineta	N	wczesna	jadalny	1996	102	103	12,9	żółta	AB	7	2
13.	Ewelina	N	wczesna	jadalny	2006	99 ⁷⁻⁹	98 ⁷⁻⁹	12,1	żółta	BC	7	3
Wzorzec 2007-10					509 dt/ha	480 dt/ha						
14.	Jelly	N	śr.późna	jadalny	2005	103	106	13,8	żółta	B	7,5	5
15.	Molli	N	b.wczesna	jadalny	2000				jas.żółt	B	7	2
16.	Gala	N	wczesna	jadalny					żółta	AB		
17.	Wega	N	wczesna	jadalny					żółta	AB		
18.	Ballerina		wczesna	jadalny					żółta	AB		
19.	Folva	N	śr. wczesna	jadalny	2003				żółta	B	7	3
20.	Hanna	N	śr. wczesna	jadalny					żółta	B		
21.	Senna	N	śr. wczesna	jadalny					żółta	AB		
22.	V 100	N	śr. wczesna	jadalny					żółta	AB		

N */ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (AB- zwięzły, sałatkowy; B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą

Oznaczenia małymi cyframi w indeksie górnym oznaczają lata badań np. 98^{8,9} oznacza średni plon 98 % wzorca dla odmiany badanej w roku 2008 i 2009.