

PSZENŻYTO JARE – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: II

Przedplon: buraki cukrowe

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsięwzięcie: N – 60 , P – 41 , K – 111
– pogłównie: N -

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 18.04.2013

Ilość wysiewu zróżnicowana odmianowo: 450 szt/m²**Odmiany:** kolejność od kamienia

1. Milewo [228]

3. Nagano [253]

2. Andrus [239]

¹ – w nawiasach podano ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
24.10.2012	Orka przedzimowa
18.04.2013	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe (kg/ha)	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
24.10.2012	41 – (P) fosforan amonu 16 – (N) fosforan amonu 111 – (K) fosforan amonu					
17.04.2013	60 – (N) salmag					
14.05.2013		Sekator 125 OD – 0,15 l/ha				

PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2012”

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2009-2011		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Dojrzałość wosk. dni od 1.01.	MTZ g	Reakcja na Al+++	Gęstość w stanie zsymp.	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunatna	Septorioza liści
		A ₁	a ₂										
Wzorzec dt z ha													
1.	Andrus	98	97	6,0	109	207	40,7	5	4	5	3	8,2	7,2
2.	Milewo	98	102	6,7	108	205	38,0	5	5	5	5	8,1	6,8
3.	Nagano	100	99	7,1	100	206	38,8	5	6	5	6	8,0	6,9

Plony:

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (14%)
1	Milewo	79,21
2	Andrus	61,85
3	Nagano	52,90
	Suma	64,7