

**PSZENICA OZIMA – Astoria – porównanie działania fungicydów****Strona lewa**

Klasa gleby: IIIa

Przedplon: rzepak ozimy

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przedsiwne: N – 21,5, P – 55, K – 100

– pogłównie: N – 70

Siew: 01.10.2013r.

Zaprawa: Baytan Universal 094 FS - 400 ml środka z dodatkiem 200 ml wody/100 kg ziarna.

Ilość wysiewu: 224 kg/ha (380 szt/m<sup>2</sup>)**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
07.08..2013	Agregat podorywkowy
09.09.2013	Orka i agregat uprawowy
01.10.2013	Agregat uprawowy

**Stosowane fungicydy: kolejność od kamienia**

Lp.	I zabieg			II zabieg		
	Zastosowany fungicyd	Dawka	Data	Zastosowany fungicyd	Dawka	Data

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
09.09.2013	21,5 – (N) fosforan amonu 55 – (P) fosforan amonu 100 – (K) sól potasowa				
24.10.2013		Komplet 560 SC – 0,5 l/ha			
11.03.2014	70 - (N) saletra amonowa				
08.04.2014		Huzar Aktiv 387 OD – 1 l/ha			