

PSZENŻYTO JARE – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: IIIa, IIIb

Przedplon: kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przewidziane: N – 79, P – 49, K – 131
- pogłównie: N - 40

Zaprawa: wg hodowcy

Siew: 27.04.2014

Ilość wysiewu zróżnicowana odmianowo: 450 szt./m²**Odmiany:** kolejność od kamienia

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Dublet [208] ¹ | 4. Milewo [206] |
| 2. Nagano [204] | 5. Andrus [214] |
| 3. Milkaro [201] | |

¹ – w nawiasach podano ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
22.10.2013	Orka przedzimowa
27.03.2014	Agregat uprawowy
31.03.2014	Agregat uprawowy

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zapobieganie wyleganiu	Zwalczanie szkodników	Dokarmianie dolistne
22.10.2013	49 – (P) fosforan amonu 19 – (N) fosforan amonu 131 – (K) fosforan amonu					
27.03.2014	60 – (N) salmag					
29.04.2014		Sekator 125 OD – 0,15 l/ha				
20.05.2014	40 – (N) saletra amonowa					
11.06.2014				Moddus 250 EC – 0,3 l/ha		

PSZENŻYTO JARE – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2013”

Nr	Odmiana	Plon (% wzorca) lata 2010-2012		Wyleganie skala 9 ⁰	Wysokość roślin cm	Dojrzałość wosk. dni od 1.01.	MTZ g	Reakcja na Al+++	Gęstość w stanie zsypania	Porastanie w kłosach	Zawartość białka	Rdza brunatna	Septorioza liści
		A ₁	a ₂										
Wzorzec dt z ha													
1.	Andrus	96	97	5,8	109	205	41,4	5	4	5	3	8,1	7,1

2.	Dublet	101	101	5,9	104	205	39,9	4	7	5	5	7,7	7,0
3.	Milewo	100	102	6,4	109	203	39,5	5	5	5	5	8,0	6,8
4.	Mikaro	98	97	5,6	109	204	40,2	5	5	5	5	8,1	6,4
5.	Nagano	100	100	6,7	100	204	39,8	5	6	5	6	7,7	7,0

Plony:

Nr poletka	Nazwa	Plon dt/ha (14%)
1	Milewo	66,18
2	Dublet	65,61
3	Milkaro	64,15
4	Andrus	60,82
5	Nagano	58,97