

**BOBIK – kolekcja odmian**

Strona lewa

Klasa gleby: IIIb

Przedplon:

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 30, P –16, K – 60

Siew: 07.04.2018 r.

Zaprawa: wg. hodowcy

**Odmiany: kolejność od kamienia**

- |                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1. Bobas [360] <sup>1</sup> | 3. Amigo [320]   | 5. Julia [280] |
| 2. Fernando [280]           | 4. Fanfare [360] |                |

<sup>1</sup> - w nawiasie podano ilości wysiewu w kg/ha**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
21.08.2017	Agregat podorywkowy Orka
27.11.2017	
15.03.2018	Agregat uprawowy
06.04.2018	Agregat uprawowy

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Biostymulator
27.11.2017	16 – (P) fosforan amonu 60 – (K) sól potasowa				
06.04.2018	30 – (N) saletra amonowa				
09.05.2018		Fusilade Forte 150 EC – 0,8 l/ha			
28.05.2018			Gwarant 500 SC – 2 l/ha	Bulldock 025 EC – 0,3 l/ha	

**BOBIK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2017”**

Lp.	Odmiana	Rok rejestracji	Plon nasion (% wzorca)	Długość okresu wegetacji (dni)	Wysokość roślin (cm)	Masa 1000 nasion (g)	Wyleganie w skali 9 <sup>o</sup> **	Zawartość białka ogólnego (% s.m.)
<b>WZORZEC (2014-2016)</b>			<b>44,8 dt/ha</b>					
1.	Bobas	2002	102	128	129	488	7,1	29,9
2.	Fernando NT	2016	104	128	123	457	7,7	30,1
3.	Amigo NT	2016	102	128	122	490	7,9	29,3
<b>WZORZEC (2015-2016)</b>			<b>41,1 dt/ha</b>					
4.	Fanfare	2017	114	126	123	491	7,6	28,0
5.	Julia	2017	107	126	127	497	7,1	30,7

NT – odmiana niskotaninowa; \* – w skali 9<sup>o</sup>, gdzie 9 – oznacza pełną odporność na wyleganie, 1 – pełną podatność na wyleganie

