

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona lewa

Klasa gleby: II

Przedplon: kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 80, P – 24, K – 162
– pogłównie: N – 30

Rozstawa: 75x23 cm

Sadzenie: 27.04.2018

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
28.09.2017	Agregat podorywkowy
07.11.2017	Orka przedzimowa
20.04.2018	Agregat uprawowy
10.05.2018	Obredlanie
25.05.2018	Obredlanie

Odmiany: kolejność od drogi

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. Tonacja | 7. Laskara | 13. Jurek |
| 2. Irys | 8. Mazur | 14. Oberon |
| 3. Altesse | 9. Tajfun | 15. Elfe |
| 4. Ignacy | 10. Denar | 16. Madeira |
| 5. Magnolia | 11. Tacja | 17. Lucilla |
| 6. Irga | 12. Gwiazda | 18. Ricarda |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
05.04.2018	24– (P) fosforan amonu 162 – (K) sól potasowa			
25.04.2018	80 – (N) salmag			
10.05.2018		Plateen 41,5 WG – 2 kg/ha		
25.05.2018	30 – (N) saletra amonowa			
		<i>Fusilade Forte 150 EC – 0,8 l/ha</i>		
			<i>Pyton Consento 450 SC– 2 l/ha</i>	<i>Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha</i>
			<i>Infinito 687,5 SC– 1,6 l/ha</i>	

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2017”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulinarny **	Smak w skali 9° ***	Odpor. na zarazę liści w skali 9°	
Wzorzec 2014-15					448 dt/ha	425 dt/ha						
1.	Tonacja	N	b. wczesna	jadalny	2016	100	101	11,7	j.żółta	AB	6,7	3
2.	Irys		b. wczesna	jadalny	1975	-	-	-	biała	B	7	3
Wzorzec 2013-16					469 dt/ha	441 dt/ha						
3.	Altesse	N	wczesna	jadalny	2009	100	97	13,3	żółta	AB	7	3
Wzorzec 2014-16					474 dt/ha	449 dt/ha						
4.	Ignacy	N	wczesna	jadalny	2012	115	116	12,6	j.żółta	B	6,5	3
Wzorzec 2013-14					459 dt/ha	430 dt/ha						
5.	Magnolia	N	wczesna	jadalny	2015	98	98,5	16,1	j.żółta	B-BC	7	4,5
6.	Irga	N	śr. wczesna	jadalny	1987	-	-	-	kremow	B	6,5	2
Wzorzec 2015-16					497 dt/ha	465 dt/ha						
7.	Laskara	N	śr. wczesna	jadalny	2013	105	105	16,7	j.żółta	B-BC	6,7	4,5
Wzorzec 2013,16					572 dt/ha	491 dt/ha						
8.	Mazur	N	śr. wczesna	jadalny	2014	101	103	16,0	j.żółta	AB	6,6	3
Wzorzec 2013-16					502 dt/ha	467 dt/ha						
9.	Tajfun	N	śr. wczesna	jadalny	2004	106	108	16,9	żółta	B-BC	7	5
Wzorzec 2013-16					454 dt/ha	428 dt/ha						
10.	Denar	N	b. wczesna	jadalny	1999	106	105	12,0	j. żółta	AB	7	3
Wzorzec 2014-15					448 dt/ha	425 dt/ha						
11.	Tacja	N	b. wczesna	jadalny	2016	94	92	12,2	j. żółta	B	6,6	3
Wzorzec 2013-16					468 dt/ha	441 dt/ha						
12.	Gwiazda	N	wczesne	jadalne	2011	106	107	12,8	żółta	B	7	3
Wzorzec 2013,16					526 dt/ha	490 dt/ha						
13.	Jurek	N	śr. wczesna	jadalne	2012	103	104,5	13,8	żółta	B-BC	7,2	4,5
Wzorzec 2013-16					502 dt/ha	467 dt/ha						
14.	Oberon	N	śr. wczesna	jadalny	2012	96	93	13,8	j. żółta	AB	7	3,5
15.	Elfe	N	wczesna	jadalny	-	-	-	13,0	żółta	B	b.d.	b.d.
16.	Madeira	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	13,0	j. żółty	B	b.d.	b.d.
17.	Lucilla	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	14,4	żółta	C	b.d.	b.d.
18.	Ricarda	N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	12	kr.-bia.	B	b.d.	b.d.

N */ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (AB- zwięzły, sałatkowy; B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą