

Klasa gleby: IVa

Przedplon: ziemniaki

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 0, P – 30, K – 44

Siew: 25.03.2020 r.

Zaprawa: wg. hodowcy

**Odmiany:** kolejność od drogi

1. migo [300]<sup>1</sup>                      2. ranit [410]                      A                      G

<sup>1</sup> w nawiasach podano ilość wysiewu w kg/ha

**Uprawa:**

Data	Zabiegi maszynowe
15.10.2019	Agregat podorywkowy
21.10.2019	Orka
05.03.2020	Włóka
24.03.2020	Agregat uprawowy

**Zabiegi pielęgnacyjne:**

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Biostymulator
18.10.2019	30 – (P) fosforan amonu 44 – (K) sól potasowa				
30.03.2020		Bandur 600 SC – 3 l/ha			
20.05.2020			Gwarant 500 SC – 2 l/ha		
10.06.2020				Bulldock 025 EC – 0,3 l/ha	

Zbiór 11.08.2020	
Odmiana	Plon dt/ha (15%)
Amigo	44,8
Granit	41,0

**BOBIK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2019”**

Lp.	Odmiana	Rok rejestracji	Plon nasion (% wzorca)	Długość okresu wegetacji (dni)	Wysokość roślin (cm)	Masa 1000 nasion (g)	Wyleganie w skali 9 <sup>o</sup> *	Zawartość białka ogólnego (% s.m.)
<b>WZORZEC (2016-2018)</b>			<b>42,0 dt/ha</b>					
1.	<b>Amigo NT</b>	2016	97	120	101	508	7,9	29,4
2.	<b>Granit</b>	2016	102	118	92	503	7,7	28,0

	<b>SK</b>							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

**NT** – odmiana niskotaninowa; **SK** – odmiana samokończąca

\* – w skali 9<sup>o</sup>, gdzie 9 – oznacza pełną odporność na wyleganie, 1 – pełną podatność na wyleganie