

ZIEMNIAKI – kolekcja odmian

Strona prawa

Klasa gleby: II

Przedplon: kukurydza

Nawożenie w czystym składniku w kg/ha: – przed sadzeniem: N – 80, P – 29, K – 126
– pogłównie: N – 30

Rozstawa: 75 x 25 cm

Sadzenie: 17.04.2020 r.

Uprawa:

Data	Zabiegi maszynowe
18.10.2019	Agregat podorywkowy
06.11.2019	Orka
05.03.2020	Włókovanie
17.04.2020	Agregat uprawowy
04.05.2020	Obredlanie
01.06.2020	Obredlanie

Odmiany: kolejność od drogi

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Surmia | 8. Ignacy |
| 2. Michalina | 9. Irga |
| 3. Ismena | 10. Amarant |
| 4. Jurek | 11. Catania |
| 5. Oberon | 12. Madeira |
| 6. Irys | 13. Omega |
| 7. Tonacja | 14. Theresa |

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników
18.10.2019	29 – (P) fosforan amonu 126 – (K) sól potasowa			
15.04.2020	80 – (N) salmag			
04.05.2020		Bandur 600 SC – 3 l/ha		
25.05.2020	30 – (N) saletra amonowa			
15.06.2020		Targa Super 5 EC – 1,25 l/ha		
23.06.2020			Infinito 687,5 SC – 1,6 l/ha	
26.06.2020				Decis Mega 50 EW – 0,15 l/ha
03.07.2020				Actara 25 WG – 0,06 kg/ha
13.07.2020			Revus 250 SC – 0,6	

				l/ha	
--	--	--	--	------	--

ZIEMNIAK – charakterystyka odmian wg „Listy opisowej odmian COBORU 2019”

Lp.	Odmiana	Grupa wczesności	Typ odmiany	Rok reje.	Plon ogól. bulw (% wzorca)	Plon handl. bulw (%wzorca)	Zaw. skrobi (%)	Barwa miąższu	Typ kulinarny **	Smak w skali 9° ***	Odpor. na zarazę liści w skali 9°
1.	Surmia N	b. wczesna	jadalny	2020	-	-	13	j.żółta-żółta	AB-B	dobry	-
Wzorzec 2015-18					478 dt/ha	451 dt/ha					
2.	Michalina N	wczesna	jadalny	2010	106	107	12,7	jas.żółta	B	6-7	3
Wzorzec 2016-17					524 dt/ha	496 dt/ha					
3.	Ismena N	wczesna	jadalny	2018	98	97	13,0	żółta	AB-B	7	3-4
Wzorzec 2016-18					533 dt/ha	495 dt/ha					
4.	Jurek N	śr. wczesna	jadalny	2012	106	106	13,5	żółta	B-BC	7	4-5
Wzorzec 2015-18					508 dt/ha	472 dt/ha					
5.	Oberon N	śr. wczesna	jadalny	2012	103	98	13,5	jas.żółta	AB	7	3-5
6.	Irys	b.wczesna	jadalny	1975	-	-	-	biała	B	7	3
Wzorzec 2015,18					415 dt/ha	389 dt/ha					
7.	Tonacja N	b.wczesna	jadalny	2016	94	95	11,4	jas.żółta	AB	6-7	3
Wzorzec 2015-18					478 dt/ha	451 dt/ha					
8.	Ignacy N	wczesna	jadalny	2012	110	111	12,5	jas.żółta	B	6-7	3
9.	Irga N	śr. wczesna	jadalny	1987	-	-		Kremow.	B	6-7	2
Wzorzec 2015,17,18					433 dt/ha						
10.	Amarant N	śr. późna	skrob.	2016	94	-	19,8	biała	-	-	6-7
11.	Catania N	b.wczesna	jadalny	-	-	-	-	kr.-bia.	B	-	-
12.	Madeira N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	-	j.żółta-żółta	B	-	-
13.	Omega N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	-	żółta	C	-	-
14.	Theresa N	śr. wczesna	jadalny	-	-	-	-	j.żółta-żółta	C	-	-

N */ – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego

** – typ konsumpcyjny (AB- zwięzły, sałatkowy; B - lekko zwięzły, ogólnoużytkowy; BC - lekko mączysty, C – mączysty)

*** – w skali 9 – stopniowej, gdzie 1 – oznacza ocenę najgorszą, 9 – oznacza ocenę najlepszą

Oznaczenia małymi cyframi w indeksie górnym oznaczają lata badań np. 106¹⁵⁻¹⁸ oznacza średni plon 106 % wzorca dla odmiany badanej w latach 2015-18.